













因

他說「尼古丁」滲進了血中，到了腦垂體腺，刺激已分泌出來一種名爲「赫爾蒙」的內分泌素，這種「赫爾蒙」由血液流到心臟。原來心臟有自身營養血管，叫做冠狀動脈，這冠狀動脈一遇到「赫爾蒙」，立刻縮窄而減少了血量。心臟塞得不到充分供給，所以心臟工作就因之減低，這樣的我們個體就落出來種種病徵。

我們在吃藥之後，摸一摸脈搏，每分鐘至

七十。

這些由密治湯大學醫科博士(CDR. G. J. P. BARDEN)所發現，成爲傳染病新療法的依據，可以消滅血中之各種病菌。據報告爲抽出一磅病人的血液，曝於適度的紫外線下，約二十秒鐘後，仍注射於本人體內即可。緣紫外線之殺菌力，久爲世人所公認，用以照射血液則之既無消毒法，但抽出全身血液而照射之既不可能，據最近研究亦此必要。

然而這種新療法尙在試驗中，其適當的分量，亦不能認爲極可靠。現雖無有奇現象發生，猶待將來多數經驗與改善，始能普遍實施也。

☆

☆葉貢問：鄙人從小右腿腰裏就發生一塊東西，時常上下左右，在做粗重工作時就在遠路時，不定下墮，大約一個小雞蛋，倘石休息一會兒或躺著，就摸不着，許多人說是「墮腸」，請問：（一）「墮腸」，有甚麼危險？（二）是否可以由醫院出診免役之答：

初患時脹大如蛋，並無痛苦，後則逐漸脹大，今腫大如拳，右睾丸亦於數年前染患斯疾，症狀一左畧小不同，惟較小而已，茲列舉數點，請在貴刊解答：（一）能否割治？（二）有無危險及痛苦？（三）需時多久？（四）手術費醫藥費及（普通病室）之膳宿費等共需款多少？

答：流，患何症，用何藥？二，頭髮因生癰，致於疤痕髮稀少，用何藥可免漸生，市上有無現成藥品可購？

答：一，須經眼科醫師診察後始可決定二，「肺癆時痛」所謂通簡無法解答，三，似為「香港脚」宜用太陽燈照射及藥以撒散酒精，

○豹管○

有一種毒藥，名曰「尼古丁」，流到血內，血管因而縮窄，血脈因之增高。選擇米

少由七〇跳增到八〇！

九〇跳，血壓也增高

一時，這樣就可知道了

心臟病，程度如何了

因此一個運動員，他在

的訓練時候，是絕對不

能吸烟的，若吸烟，他

的心內細胞，因為減少

了血液的氧量，而他的

成績絕對不會好的。」

病人本身的血液經

通紫外光線的片刻照射

後，即發生強烈的化學

變化，成為能抵抗所有

病菌的藥業。血液主要

功用之一的運轉氧氣作

病

界學醫。

。法新之療治病染傳對界學醫。

通家外光線之片刻照射後，即發生強烈的化學變化，成爲能抵抗所有病菌的藥業。血液主要功用之一之運轉氧氣作用，顯著增加。身體中之戰士，白血球，對細菌的戰鬥力，亦由百分之四十增至百分之七十。

這些由喬治湯大學醫科巴里士(Dr. G. J. P. BARDER)所發現，成爲傳染病新療法之依據，可以消滅血中之各種病菌。據報告爲抽出一磅病人於適度的紫外線下，約二十分鐘注射於本人體內即可。線乃注射於人體之背脊，力爲人體人所公認，用則是標準消毒法，但抽出注射之既不可能，據最近研究種新療法尚在試驗中，其究亦不能認爲極可靠。現雖無生，猶待將來多數經驗與改進實施也。

---

本刊「醫藥問答」一欄，爲患者解藥而張，有疑問者，可逕函本市報社內編輯部，或寄到本醫院，惟文字須直書清楚，並請註明軍中住址，及真實姓名，以便通訊。

本刊「醫藥問答」一欄，爲患者解藥而張，有疑問者，可逕函本市報社內編輯部，或寄到本醫院，惟文字須直書清楚，並請註明軍中住址，及真實姓名，以便通訊。

不足，是什麼原因？

三、鹿耳補腎對這種病有利害關係嗎？

四、請問有什麼特效藥，共有價錢若干？

五、這種病究竟應叫什麼病，應該如何療治？

答：

一、是腎陽病。不對。

二、與鹿耳無關，其原因待詳細檢查及問診後才能斷定。

28

是喇叭管切斷法。都是絕對避姦的方

二、(一)大概在月經後十四天和  
次月經前七天，中間期間約十天左  
右，這十天是排卵期最好兩性不要接觸  
(二)性交前後用稀酸水洗滌女陰  
(最少事後要普通溫水洗淨陰道內外  
物)。

三、非嚴格的可以說無害

水葉開

一、銀壁內生一小孩，現已長大，  
茲將開列如下：

(一)身體矮小，是否因包皮之故  
(二)包皮割治後，身體能否繼續  
長大如常人？

(三)割包皮有否痛苦，時間多久  
，手術費若干？

答：一、自身矮小與包皮無關  
二、既與包皮無關應分尋覓有不全  
原因之所在  
三、風寒不孕症係因子宮寒冷不可

[illegible]